

Instituto Butantan (IB): vacina adsorvida covid-19 (Inativada)

Fabricante: Sinovac Life Sciences Co., Ltd. Parceria: Sinovac/Butantan.

Descrição	Vírus inativado
Indicação de uso	Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos
Apresentação	Frascos ampola, multidose (10 doses)
Via de administração	IM(Intramuscular)
Esquema vacinal/intervalos	2 doses de 0,5 ml, intervalo entre doses de 4 semanas
Validade após abertura do frasco	8 horas
Reações comuns	<ul style="list-style-type: none">✓ <u>Local da aplicação:</u> dor, vermelhidão, inchaço, enduração, coceira.✓ <u>Sistêmica:</u> dor de cabeça, cansaço, náuseas, diarreia, dor muscular, calafrios, perda de apetite, tosse, dor nas articulações, coriza, congestão nasal.
Reação incomum	<ul style="list-style-type: none">✓ <u>Local da aplicação:</u> hematoma.✓ <u>Sistêmica:</u> vômito, febre, vermelhidão, reação alérgica, dor na garganta, dor ao engolir, espirros, fraqueza muscular, tontura, dor abdominal, sonolência, mal estar, dor nas extremidades, dor abdominal superior, dor nas costas, vertigem, falta de ar, inchaço.

Observações:

- ☐ **A vacina CoronaVac/ Butantan é segura para gestantes e puérperas;**
- ☐ Se você estiver com alguma doença aguda ou com febre ou início agudo de doenças crônicas não controladas no momento da vacinação, esta vacina deve ser adiada.
- ☐ Esta vacina deve ser administrada com precaução caso você tenha *trombocitopenia* ou *coagulopatias*, uma vez que podem ocorrer hemorragias após a aplicação intramuscular.
- ✓ Caso você tenha deficiência na produção de anticorpos, seja por problemas genéticos, imunodeficiência ou terapia imunossupressora, a resposta imunológica pode não ser alcançada.
- ✓ Pessoas com histórico de *anafilaxia*, devem procurar orientação médica antes da vacinação.

Vacina covid-19 (recombinante) – Astrazeneca/ Fio Cruz
Fabricante: Serum Institute of India - COVAX

	Astrazeneca/ Fio Cruz	Astrazeneca/ Serum Institute of India	Astrazeneca/ Covax
Descrição	Vetor viral		
Faixa etária	A partir de 18 anos de idade		
Apresentação	Frasco ampola multidose - 5 doses	Frasco ampola multidose - 10 doses	Frasco ampola multidose - 10 doses
Esquema vacinal	2 doses de 0,5 ml, com intervalo de 12 semanas.		
Via de administração	IM (Intramuscular)		
Validade após abertura do frasco	8 horas		
Reações comuns	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>No local da aplicação</u>: dor, coceira e hematoma. ✓ <u>Sistêmicas</u>: Fadiga, dor de cabeça, calafrios, náuseas, dor nas articulações e muscular, febre, dor de garganta, coriza, tosse. 		
Reações Incomuns	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Sistêmicas</u>: Sonolência ou sensação de tontura, diminuição do apetite, dor abdominal, linfonodos (ínguas) aumentados, sudorese excessiva, coceira na pele ou erupção na pele, reação alérgica grave (anafilaxia), inchaços graves nos lábios, face, boca e garganta (que pode causar dificuldade em engolir ou respirar). 		

Observações:

- ✓ **Esta vacina *não deve ser utilizada* por mulheres grávidas ou puérperas;**
- ☐ Se você atualmente tem uma infecção grave com febre alta (maior que 38°C), adie a vacinação até melhora dos sintomas. No entanto, uma febre leve ou uma infecção leve, como um resfriado, não são razões para atrasar a vacinação;

Converse com seu médico antes da vacinação com Astrazeneca Fio Cruz:

- ☐ Se você já teve um coágulo sanguíneo ou baixos níveis de plaquetas no sangue (trombocitopenia) no passado;
- ☐ Se você tem problema com sangramentos ou aparecimento de marcas roxas ou se você estiver recebendo medicamentos que afinam o sangue (anticoagulante);

- ☐ Se seu sistema imune não funciona adequadamente (imunodeficiência) ou se estiver recebendo medicamentos que enfraquecem o sistema imune (como corticosteroides em doses altas, imunossupressores ou medicamentos contra o câncer);
- ☐ Se você já teve uma reação alérgica grave (anafilaxia) após qualquer injeção de qualquer outra vacina.

Vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) - Wyeth
Fabricante: Pfizer/BioNtech

Descrição	RNA Mensageiro
Faixa etária	A partir de 18 anos de idade
Apresentação	Frasco ampola multidose – 6 doses (Diluição em 1,8ml de cloreto de sódio)
Esquema vacinal	2 doses de 0,3 ml, com intervalo de 12 semanas.
Via de administração	IM (Intramuscular)
Validade após abertura do frasco	6 horas
Reações comuns	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>No local da aplicação:</u> dor, inchaço e vermelhidão. ✓ <u>Sistêmica:</u> cansaço, dor de cabeça, náuseas, vômito, diarreia, dor muscular, dor nas articulações, calafrios e febre.
Reações Incomuns	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Local da aplicação:</u> coceira. ✓ <u>Sistêmicas:</u> aumento dos gânglios linfáticos (ou ínguas), erupção cutânea (lesão na pele), prurido (coceira), urticária (alergia da pele com forte coceira), angioedema (inchaço das partes mais profundas da pele ou da mucosa), diminuição de apetite, dor nos membros (braço), insônia, letargia (cansaço e lentidão de reações e reflexos), suor excessivo, suor noturno, astenia (fraqueza, cansaço físico intenso), paralisia facial aguda, anafilaxia.

Observações:

- ✓ **Esta vacina é segura para mulheres grávidas ou puérperas;**
- ☐ Se você atualmente tem uma infecção grave com febre alta (maior que 38°C), adie a vacinação até melhora dos sintomas. No entanto, uma febre leve ou uma infecção leve, como um resfriado, não são razões para atrasar a vacinação;

Converse com seu médico antes da vacinação se:

- Você já teve um coágulo sanguíneo ou baixos níveis de plaquetas no sangue (trombocitopenia) no passado;
- Você tem problema com sangramentos ou aparecimento de marcas roxas ou se você estiver recebendo medicamentos que afinam o sangue (anticoagulante);
- Seu sistema imune não funciona adequadamente (imunodeficiência) ou se estiver recebendo medicamentos que enfraquecem o sistema imune (como corticosteroides em doses altas, imunossupressores ou medicamentos contra o câncer);
- Você já teve uma reação alérgica grave (anafilaxia) após qualquer injeção de qualquer outra vacina.

Vacina contra COVID-19 (recombinante) Janssen – Cilag Farm.

Fabricante: Jhonson & Jhonson

Descrição	Vetor viral
Faixa etária	A partir de 18 anos de idade
Apresentação	Frasco ampola multidose – 5 doses
Esquema vacinal	Dose Única de 0,5 ml.
Via de administração	IM (Intramuscular)
Validade após abertura do frasco	6 horas
Reações comuns	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> <u>No local da aplicação</u>: dor, vermelhidão e inchaço.<input type="checkbox"/> <u>Sistêmicas</u>: Cefaléia, náusea mialgia, fadiga, tosse, artralgia e febre.
Reações Incomuns	<ul style="list-style-type: none">✓ <u>No local da aplicação</u>: irritação na pele.✓ <u>Sistêmicas</u>: tremor, espirros, dor de garganta, fraqueza muscular., dor nas extremidades e nas costas

Observações:

- ✓ **Esta vacina NÃO deve ser usada por mulheres grávidas e puérperas;**
- ✓ Reações relacionadas à ansiedade, incluindo reações vasovagal (síncope), hiperventilação ou reações relacionadas ao estresse podem ocorrer em

associação com a vacinação como uma resposta psicogênica à injeção da agulha.

- ✓ A vacinação deve ser adiada em indivíduos que sofram de doença febril aguda grave ou infecção aguda. No entanto, a presença de uma infecção leve e/ou febre baixa não deve atrasar a vacinação.

Como com outras injeções intramusculares, a vacina deve ser administrada com cautela em indivíduos recebendo terapia anticoagulante ou aqueles com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação (como hemofilia) porque sangramento ou hematomas podem ocorrer após uma administração intramuscular nesses indivíduos